

## 準備するもの

- ・1,000mlの滅菌生理食塩水が入る容器
- ・無菌の非外傷性鉗子
- ・滅菌生理食塩水 3,000ml (1,000mlを3回分)

1.

無菌の非外傷性鉗子を使用 してパッチを包装容器から 2.

3.

リンスに使用する容器を1,000ml の滅菌生理食塩水で満たします。 パッチを滅菌生理食塩水中で

4 分間すすぎます。 (1回目)

滅菌生理食塩水を取り換えます。

6.

取り出します。

リンスに使用する容器を1,000ml の滅菌生理食塩水で満たします。 パッチを滅菌生理食塩水中で 4 分間すすぎます。 (3回目) **5.** 

4.

滅菌生理食塩水 を取り換えます。 リンスに使用する容器を1,000ml の滅菌生理食塩水で満たします。 パッチを滅菌生理食塩水中で 4 分間すすぎます。(2回目)

**7.** 

リンス後に使用するまでは、 乾燥を防ぐためパッチは 滅菌生理食塩水に 浸しておきます。 使用前に必ず製品のリンス(洗浄)を行ってください。

4分×3回で合計12分です。



※ご使用前には必ず添付文書をご確認ください



レメイト・バスキュラー合同会社

東京都千代田区一番町16-1 共同ビルー番町1F TEL:03-5215-5681 FAX:03-5215-5682